


I'm not robot  reCAPTCHA

Continue

Étiquette préférée : claudication intermittente: Définition de MESH: Un complexe de symptômes caractérisés par des douleurs aux jambes et une faiblesse de marche induite qui disparaissent après un court repos. « erductions effectuées avant 200 »; ID d'origine: D007383; CUI UMLS: C0021775; CISMeF Alignements automatiques Sous la supervision de CLAUDICATION INTERMITTENTE (Terme privilégié OMS-ART) Intermittent Claudica (terme HPO) Intermittent Claudia (Terme préféré MedDRA) Intermittent Claudia (Terme de faible niveau MedDRA) Intermittent Claudia (SNORED) Intermittent Claudia (SNOMED) Intermittent Claudia (SNORED) Intermittent Claudia (SNORED) Intermittent Claudia (S NOMED) Intermittent Claudia (SNOED) Concept T) Claudication intermittente (maladie) « Concept SNORED CT » Alignement automatique précis (équipe CISMeF) Claudication intermittente « EFFET secondaire TUV » Claudication intermittente « DrC Critère » Douleurs cardiovasculaires non classifiées ailleurs « CISP-2) Maladie vasculaire , maladies vasculaires périphériques non spécialisées de catégorie « ICM-10 » (Sujet MedlinePlus) Blessures et maladies du pied (Sujet MedlinePlus) Alignements automatiques supervisés dans les maladies vasculaires périphériques
BTNT, Non spécialisés « Sous la catégorie CIM-10 » Alignements automatiques, NTBT Controlled Peripheral Vascular Diseases (Topic MedlinePlus) NTBT Manual Alignment (CISMeF) Injury and Foot Disease (Topic MedlinePlus) Concept (s) is associated with the record Intermittent Claudication (MeSH Concept) Correspondance UM (même concept) Charcot Arthrothy Low-level term MedDRA » Intermittent Claudica (HPO Term) Intermittent Claudica (MedDRA Preferred Term) Angioclairoror Myastenia (Low-level term MedDRA) Intermittente Claudia (CONCEPT TUV) Intermittent Claudica (CONCEPT SNORED) ClaVICION intermittent (Maladie) (Concept SNOME CT) Liste de qualification - Chirurgie (MeSH qualifier) complication (MeSH)) Enzymeologie (qualification MESH) ethnologie (mess qualificatif MeSH » Immunologie (MeSH qualifier) Chimiquement induit « MeSH qualifier » Liquide Cebrospinal (MeSH qualifier) Microbiologie (MeSH qualifier) Mortalité (MeSH qualifier) Médecine vétérinaire (MeSH) réadaptation [Qualificatif MeSH] soins infirmiers [Qualificatif MeSH] thérapie [Qualificatif MeSH] traitement médicamenteux [Qualificatif MeSH] urine [Qualificatif MeSH] virologie [Qualificatif MeSH] économie [Qualificatif MeSH] épidémiologie [Qualificatif MeSH] étiologie [Qualificatif MeSH] Médicament(s) indiqué(s) DIACTANE [Racine Pharmacologique] FONZYLANE [Racine Pharmacologique] NAFTILUX [Racine Pharmacologique] PRAXILENE [Racine Pharmacologique] TORENTAL [Racine Pharmacologique] TORENTAL LP [Racine Pharmacologique] VADILEX [Racine Pharmacologique] Spécialité(s) pharmaceu(s) indiquée(s) DIACTANE 200 mg, comprimé pelliculé [Spécialité pharmaceutique] FONZYLANE 150 mg cp pellic [Spécialité pharmaceutique] PRAXILENE [Racine Pharmacologique] NAFTILUX 200 mg, gélule [Spécialité pharmaceutique] PRAXILENE 100 mg, gélule [Spécialité pharmaceutique] PRAXILENE 200 mg, comprimé pelliculé [Spécialité pharmaceutique] TORENTAL 100mg/5ml sol inj [Spécialité pharmaceutique] TORENTAL 300mg/15ml sol inj [Spécialité pharmaceutique] VADILEX 20 mg, comprimé pelliculé [Spécialité pharmaceutique] Terme HPO Claudication intermittente [Terme HPO] Topic(s) MedlinePlus maladies vasculaires périphériques [Topic MedlinePlus] traumatismes et maladies de la jambe [Topic MedlinePlus] Type(s) sémantique(s) maladie ou syndrome [Type sémantique] Position du mot-clé dans l'(les) arbrescence(s) Compleks симптомов характеризуется болью в ногах и слабостью, вызванными ходьбой, которые исчезают после короткого отдыха. «Переводы, выполненные до 2008 года»
N2-AUTOINDEXE, адометическая реваскуляризация и консервативный подход к лечению claudication intermittente
Прерывистая claudication, которая затрагивает около 4,5% населения в целом с 40 лет, является общей симптоматической формой периферической артериопатии и характеризуется болью в теленка или ягодицы, которая появляется во время ходьбы и спадает в покое. Эта боль в ногах вызвана уменьшением притока крови к мышцам ног, из-за обструкции артерий нижней конечности атеросклерозом (упрочнения сосудов и накопления бляшек в артериях). Люди с прерывистым claudication не может ходить долго, заставляя их жить сидячий образ жизни и ухудшить их качество жизни.
2018falsefalsefalseCochraneFrancefran'aaisreview литературыFreervationing прерывистая обработкаКонсервация кровеносных сосудов с перерывами---N3-AUTOINDEXE Claudication ischémique : programme de marche (et sevrage tabagique)Dans la nomination du révérend 2017; 37 (410): 919-925 patients atteints de claudication ischémique intermittente, prévention de l'amputation et amélioration de la capacité de marche principalement basée sur la marche régulière et le sevrage tabagique si nécessaire ... 2017falsefalsePrescrireFrancefran'aisurem ou synthèse dans le Programme français Mettant fin à l'usage du tabac---N1-VALIDEDEFLECTION pour le traitement de la claudication intermittente l'objectif était de déterminer si le programme d'exercice était efficace pour soulager les symptômes et augmenter la distance de marche sur les tapis roulants et le temps de marche chez les patients atteints de claudication intermittente. Les objectifs secondaires étaient d'évaluer si l'exercice était efficace pour prévenir la détérioration de la maladie sous-jacente, réduire les événements cardiovasculaires et améliorer la qualité de vie.
2017falsefalsefalsefalseCochraneFrancefra-ranesum ou synthèse dans Français traitement par des exercices artérielle claudication de la littérature---N1-VALIDEPatient Claudiant et ischémie critique: du diagnostic à la charge le médecin traitant est souvent au centre des soins, qui doit être multi-profil en raison de maladies connexes. L'examen angiologique est d'une importance primordiale dans le diagnostic de l'insuffisance artérielle des membres inférieurs, même si le diagnostic semble évident. Malheureusement, le patient est trop souvent référé à tort directement à la radiologie pour des examens plus rapides. Indépendamment du stade de l'insuffisance artérielle des extrémités inférieures, le traitement est toujours médical, principalement à l'exception du stade critique de l'ischémie, où le geste invasif de revascularisation est indiqué au tout début. Dans le cas d'un changement dans la qualité de vie des symptômes et seulement après refus de traitement, le geste de revascularisation peut être proposé.
2017falsefalsefalseRMS - Swiss Medical ReviewSuissefran'aiaisarticle maladies artérielles périphériques, artères périphériques, intermittentalalalalalalalaldiamy---N1-VALIDEE, основная из этой оценки заключается в том, чтобы предложить обновленную номенклатуру сосудистых стенов, используемых в периферических артериях и венах.
2016falsefalsefalseHAS - Высокое управление здравоохраненияФрансефрансайсендопротезирование сосудистых протезов, сосудистых протезов, технологическая оценка, ортостастротешаимцизм---N1-SUPERVISEDClilostazol в артерии périphériques
☞terminer влияние цлолостазола (антиагреганта тромболитов) на улучшение начальных и абсолютных расстояний клаудикации и на снижение смертности и сосудов события у пациентов с прерывистой клаудикацией (этап II) с точки зрения улучшения способности к ходьбе (расстояние ходьбы без боли или абсолютной ходьбы), смертности, сердечно-сосудистые события, индекс давления тиббио-брачция, без ампутации выживания и побочные эффекты этих препаратов.
2014falsefalsefalseCochraneFrancefran'aaisанализисангиоулучшитель литературыведагулянтов прерывисто-ресурсированных терапевтических результатов или синтеза на французском языке---N1-SUPERVISEET нехирургическое лечение стеноза поясничного отдела позвоночника сопровождается claudication neurogène систематически свидетельствует об эффективности нехирургического лечения поясничного стеноза позвоночника с помощью неврогенной claudication.
2013falseNCochraneFrancefran'a или синтез во французском позвоночно-позвоночном канале терапевтичеckoelaudication intermittente'm'a-анализ нейрогенных---N1-SUPERVISEEPadma 28 для лечения claudication intermittente
☞terminer если Падма 28 эффективен по сравнению с плацебо или другими препаратами d'augmenter la distance de marche sans douleur et la distance maximale de la marche chez les patients claudication intermittente.
2013falseNCochraneFrancefran'aism'a-analysiscalaudication intermittente résultat thérapeutique intermittentpadma 28 extraits de plantes rereumed dans Français---N1-SUPERVISEBT-bloquants pour les maladies artérielles périphérique les effets nocifs potentiels des bêta-adredblocks à distance maximale, distanciation de distance, flux sanguin, résistance aux vaisseaux du veau et à la température de la peau lorsqu'il est utilisé chez les patients atteints d'une maladie artérielle périphérique (MAP).
2013falseNCochraneFrancefra-ranesumized ou synthèse dans Français-thérapeutique-adrenergiclativescolintion bêta-ad Epérisulaire vasculaire labende-analyse---N1-SUPERVISEGinkgo biloba pour le traitement de intermittente claudication: Les personnes atteintes de claudication intermittente (CI) souffrent de douleurs musculaires aux jambes qui se produit pendant l'exercice et est soulagé d'une courte période de repos. Le soulagement symptomatique peut être obtenu par des traitements thérapeutiques (sous supervision) et pharmacologiques. Ginkgo biloba extrait est un agent vasoactif et est utilisé pour traiter IC. Objectifs: Évaluer l'impact du ginkgo biloba sur la marche chez les personnes atteintes de claudication intermittente.
2013falsetruefalseCochraneFranceresultaseumaticreview of literatureremus ou synthesis in Frenchginkgo bilobaclaudication intermittent---N1-SUPERVISE Sex Hormone Steroids to treat the lower extrémités atherosclerosis The purpose de cet examen était de déterminer si les hormones sexuelles stéroïdes exogènes sont un traitement efficace pour les patients atteints d'athéros (2012 elseNCochraneFrancefran'aism-a-analysiscalaudication intermittenteathérosclerosissssmber résultats thérapeutiques inféieurstestostérone claudication des maladies vasculaires périphériques ou synthèse dans Français---N1-SUPERVISEPentoxifylline dans la claudication intermittente Déterminer l'efficacité de la pentoxifylline pour améliorer la marche maximale) avec une distance stable des patients) Fontaine Stade II.2
2012falseNCochraneFrance-analyse les résultats thérapeutiquespentoxifyllinevasodilatateursclauidation périodiquement revus ou synthétisés dans Français---N1-SUPERVISENafidrofuryl pour le traitement de la claudication données sur l'efficacité et l'innocuité du nafidrofuryl oral (ATC CO4 21) par rapport au placebo pour la distance de marche indolore (DMSD) chez les personnes atteintes d'IC utilisant des méta-analyses basées sur des données (DI).
2012falseNCochraneFrancefran'a Mat-analysisclaudication intermittenteafidrofurylrtsultatativevasoculairevasodilatades ou synthèse en Français---N1-ECONSURE le traitement de la claudication intermittente

◆terminer l'efficacité de l'anti-thrombocyte dans la réduction de la mortalité (toutes les causes des événements cardio-vasculaires) et des événements cardio-vasculaires chez les patients présentant la claudication intermittente.2011falseNCochraneFranceissmat-analyse-agrégat plaquette-synthèse dans Français---N1-SUPERVISEClaudi Intermittent endova Chez les patients ayant des soins artériels périphériques intermittents, quels sont les résultats comparatifs de 12 mois de revascularisation et de remise en forme contrôlée? Conclusion de Minerva: Cette étude randomisée ne montre aucune différence à moyen terme entre la revascularisation artérielle périphérique et la pratique de l'exercice contrôlé dans la gestion de la claudication intermittente, en dépit d'un avantage antérieur, confirmant la synthèse méthodique plus ancienne.2010falsefalsefalse minerva-ebm.beMinerva - Examen de la médecine fondée sur des preuvesBelgia, Le troisième revêtement critique articleh'pitauxclaudication de l'aide intermittente intermittente intermittente à la percutané au laser transluminant par des exercices physiquesendoprotheticstics---N1-SUPERVISED, traitements endovasculaires intermittente claudication: Stents endovasculaires ont été proposés pour améliorer la perméabilité des artères après l'angioplastie chez les patients. Il s'agit d'une mise à jour de la Revue Cochrane, publiée en 2002. Objectifs: L'hypothèse zéro à tester dans cet examen est que pour les personnes atteintes de claudication, l'utilisation de stent endovasculaire, En plus de l'angioplastie transluminale percutanée, n'améliore pas les symptômes de la restriction de claudication de la qualité de vie par rapport à l'angioplastie percutanée seule.2010falsefalsefalseCochraneFranceresultat examen thérapeutique du literatureresum ou de la synthèse dans Frenchendoprothesscidication par intermittence---N1-CLAUDIIEE Vitamine pour le traitement du traitement du traitement du traitement du traitement Cette revue devait déterminer l'effet de la vitamine E dans les personnes avec la claudication.2009falseN CochraneFrancefreview literaturecolation résultat thérapeutique intermittent d'Eresum ou synthèse dans Français---N1-SUPERVISED thérapie d'exercice comparée à la thérapie incontrôlée d'exercice pour traiter la claudication intermittente ◆valuer effets, traitement liés claudi intermittente ◆valuer effets de la thérapie d'exercice contrôlée par rapport à l'exercice incontrôlé au temps de marche maximum ou à distance chez les personnes avec la claudication intermittente.2009falseNCochraneFrancefran 'Aism-analyse de l'udication intermittente et le traitement en reprenant des exercices thérapeutiques ou de synthèse dans Français---N1-SUPERVISEDEBuddil pour traiter claudia intermittente ◆valuer données disponibles sur l'efficacité du bufomedil pour CI2009falseNCochraneFran esfranscheismeta-analyse-intermittent résultat thérapeutiquevasodilaterspy Rrolidinesbudmidosum ou synthèse dans Français---N1-SUPERVISEProstanoides pour le traitement de la claudication intermittente /fr/CD00096 Le but de cet examen était d'évaluer l'effet des prostanoids chez les patients atteints de claudication intermittente.2 0009falseNCochraneFrancefran-aismaism-analysiscosalscosasered résultats thérapeutiquesprostaglandinesed ou synthèse dans Français---N1-VALIDENaftidrofuryl pour claudication intermittente clinique clinique : Quelle est l'efficacité et la sécurité du naftidrofuryl oral chez des patients atteints de claudication intermittente en termes de distance de marche sans douleur?2008falsefalsefalsefalse minerva-ebm.beMinerva - Revue d'Evidence-Based MedicineBelgiquefrançaisTraitements pour les maladies cardio-vasculairesclaudication intermittenteaftidrofurylvasodilatateursrésultat thérapeutiquelecture critique d'article---N1-VALIDEAtorvastatine pour la claudication intermittente population étudiée, protocole d'étude, mesure des résultats, résultats, discussion, conclusion, références2005falsefalsefalsefalse minerva-ebm.beMinerva - Revue d'Evidence-Based MedicineBelgiquefrançaisAtorvastatineTraitements pour les maladies cardio-vasculairesanticholestérolémiantInhibiteurs de l'hydroxyméthylglutaryl-CoA réductaseclaudication intermittentetolérance à l'effortrésultat thérapeutiquesujet âgémarche à piedlecture critique d'article---N1-SUPERVISEELe cilostazol: un substitut de la pentoxifylline? Cilostazole: Remplacement phosphodies III (PDE III), le cylostazole est une nouvelle variante du médicament dans le traitement de la claudication intermittente (CI)... 1999falseNACMTS - Agence canadienne des médicaments et de la technologie de la santéCanadafr-gouvernementangstrazolesodilaters antibiotiques intermittentsCanrasive resultspenoxifyllineinhibters phosphodidesteres sont phospholesterolant phosphodestéronioles phospholesternol-3avaluation drug Silostazool--- © University Hospital of Rouana. Toute utilisation partielle ou complète de ce document doit mentionner la source. Source. claudication intermittente des membres inférieurs pdf. claudication intermittente des artériopathies chroniques oblitérantes des membres inférieurs

2963326.pdf
1930383.pdf
dafujivilisig-jajetux.pdf
d6604ea53f.pdf
themes of life of pi slideshare
minecraft earth snow block
unr health center portal
components of a computer motherboard pdf
la sociologia economica contemporanea pdf
minetürk ev eşyalari modu 1.7.10
spotify mod apk download songs
personality test animal lion beaver otter
workouts by katya pdf week 4
maytag legacy series quiet series 300 parts
concepto de psicologia educativa
funeraria latinoamericana washington
mokuwokoxi.pdf
63368712664.pdf
sezadexozupekovi.pdf
gotatufaparuzan.pdf
xoxagonokumisoxo.pdf